

## Käfer, Libellen und andere Insekten am Gewässer

### Lernzielkontrolle

#### Ergänze die fehlenden Begriffe.

Das Außenskelett der Käfer ist sehr \_\_\_\_\_ und bildet einen \_\_\_\_\_.

Der Körper ist in \_\_\_\_\_ Abschnitte unterteilt. Unter den harten Vorderflügeln, die \_\_\_\_\_ genannt werden, liegt ein Paar \_\_\_\_\_ Hinterflügel.

Käfer besitzen \_\_\_\_\_ Mundwerkzeuge und durchlaufen eine \_\_\_\_\_ Verwandlung.

Die Larven des Maikäfers werden \_\_\_\_\_ genannt und leben bis zu \_\_\_\_\_ im Boden. Dort ernähren sie sich von den \_\_\_\_\_.

Der Hirschkäfer ist selten und der \_\_\_\_\_ heimische Käfer.

Der Marienkäfer ernährt sich von \_\_\_\_\_. Er wird als \_\_\_\_\_ bezeichnet.

Der \_\_\_\_\_ ist in der \_\_\_\_\_ gefürchtet, weil seine Larven Gänge in die Borke von Bäumen fressen.

Libellen sind geschickte \_\_\_\_\_, die ihre Beute im \_\_\_\_\_ fangen.

Die großen \_\_\_\_\_ können \_\_\_\_\_ voneinander bewegt werden.

Libellen paaren sich, indem sie ein \_\_\_\_\_ bilden. Die Eier werden an \_\_\_\_\_ abgelegt. Die \_\_\_\_\_ Larven

leben im \_\_\_\_\_. Die älteren Larvenstadien werden als \_\_\_\_\_ bezeichnet. Libellenlarven besitzen \_\_\_\_\_ Puppenstadium.

Wasserläufer nutzen die \_\_\_\_\_ des Wassers, um sich darauf zu bewegen.

Stechmücken oder \_\_\_\_\_ entwickeln sich im Wasser. Die \_\_\_\_\_ Tiere können mit ihrem \_\_\_\_\_ Blut saugen.

Köcherfliegenlarven sind Anzeiger der \_\_\_\_\_.

Ihre Larven bauen Wohnröhren, die sogenannten \_\_\_\_\_.