

Schwangerschaft, Geburt und Entwicklung des Kindes, Verhütung

Lernzielkontrolle

Ergänze die fehlenden Begriffe.

Hat der Geschlechtsverkehr zum Zeitpunkt des _____ stattgefunden, wird die Eizelle noch im _____ befruchtet. Nur ein Spermium kann die _____ der Eizelle durchdringen. Nun verschmelzen die _____ der Geschlechtszellen. Die befruchtete Eizelle wird _____ genannt und beginnt sich bereits in den nächsten Stunden zu teilen. Im Laufe der Zellteilungen wird der Embryo in Richtung _____ transportiert. Dort nistet er sich in der _____ ein. Es bildet sich der Mutterkuchen (die _____), über die das Baby mit _____ und _____ aus dem Blut der Mutter versorgt wird. Vom Tag der Befruchtung an dauert die Schwangerschaft rund _____. Ab dem 3. Monat nennt man das ungeborene Kind _____. Wenn zwei Eizellen gleichzeitig reifen und von zwei Spermien befruchtet werden, können sich _____ Zwillinge entwickeln. _____ Zwillinge entstehen, wenn sich der Embryo bei einer Teilung in einem frühen Stadium _____ getrennt hat.

Das Zusammenziehen der Gebärmuttermuskulatur in regelmäßigen Abständen nennt man _____. In der _____ wird der Kopf des Kindes nach unten gedrückt und der _____ öffnet sich. Dabei platzt meist die _____. In der _____ wird das Kind durch den _____ gepresst. Das Kind gelangt durch die _____ nach außen. Atmet das Kind selbständig, kann die _____ durchtrennt werden.

Die Sicherheit einer Verhütungsmethode gibt der _____ an. Je _____ er ist, umso sicherer ist diese Verhütungsmethode. Zu den Verhütungsmitteln zählen zB Zäpfchen (chemisch), das _____ (mechanisch) oder die _____ (hormonell).